
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
SZÚ


Černý kašel

aktuální epidemiologická situace a stav vakcín

Pertuse, ČR, počet případů (rok 2024) + porovnání (roky 2019 – 2023)



Pertuse, ČR, kumulativní počty věkových skupin (2024) + porovnání (2019-2023)




Očkovací kalendář pro děti


Termín Věk dítěte	Povinná hrazená očkování	
	Nemoc	Očkovací látka
od započatého 9. týdne (2 měsíce)	**Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b**	Hexavakcína: Infanrix Hexa, Hexacima 1. dávka *
4 měsíce	**Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b**	Hexavakcína: Infanrix Hexa, Hexacima 2. dávka*
11.–13. měsíc	**Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, virová hepatitida B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae b**	Hexavakcína: Infanrix Hexa, Hexacima 3. dávka*
od dovršení 5. do dovršení 6. roku věku dítěte		
	Záškrt, tetanus, černý kašel	Tdap vakcína: Infanrix, Boostrix (přeočkování)
od dovršení 10. do dovršení 11. roku	**Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna**	Tdap-IPV vakcína: Boostrix polio, Adacel Polio (přeočkování)

Spotřeba vakcín proti černému kašli

Srovnání počtu vykazaných očkování proti černému kašli dle jednotlivých vakcín v letech 2023 a 2024 - období 1.1. až 4.4.




Srovnání počtu vykazaných očkování proti černému kašli dle jednotlivých vakcín u osob starších 19 let v letech 2023 a 2024 - období 1.1. až 4.4.




V roce 2023 bylo dle záznamů v ISIN aplikováno od 1.1. do 4.4. celkem 43 703 dávek vakcín Adacel, Boostrix a Adacel Polio, ve stejném období letošního roku pak téměř 88 tisíc dávek těchto vakcín. Tento významný nárůst je spojen zejména se zájmem o očkování u dospělých, který je nyní již dvojnásobný ve srovnání s počtem očkovaných dospělých za celý rok 2023.

Pravidelné a mimořádné dodávky vakcín DTaP a DTaP+Polio



V letošním roce bude dle plánu dodávek dodáno více než 400 tisíc dávek vakcín proti černému kašli (Adacel, Boostrix, Adacel Polio) k zajištění pravidelného očkování dětí, včetně přeočkování v 5 a 11 letech a k očkování dospělých.
Významně je navýšen zejména počet očkovacích látek pro očkování dospělých ve srovnání s předchozími roky.

Mimořádné dodávky vakcín DTaP a DTaP+Polio



Očkování dětí

Očkování dospělých

Očkování dospělých + děti

Základní doporučení

	Dodržování termínu očkování v rámci pravidelného očkování dětí.
	Doporučení očkování těhotných Nejlepší načasování očkování je od 27. gestačního týdne, vzhledem k maximálnímu přenosu mateřských protilátek do těla plodu.



Často si myjte ruce vodou a mýdlem (popřípadě použití dezinfekčního prostředku na ruce na bázi alkoholu)



Při kašli nebo kýchání si zakryjte ústa a nos



Pravidelně větrejte



Omývání či dezinfekce dotykových ploch

Příspěvek zdravotní pojišťovny na očkování proti černému kašli

Skupina	VZP	VoZP	ČPZP	OZP	ZPŠ	ZPMV ČR	RBP
Děti	0	1500	1500	1000	1000	0	1000
Dospělí	500	700	1000	1000	1000	2000	1000
Senioři	500	700	1000	1000	1000	2000	1000
Těhotné ženy	500	700	1000	4000	1000	2000	1000
Těhotné ženy specificky navíc	NE	NE	NE	ANO	NE	NE	NE