


V Liberci 5. ledna 2024

## Aktuální epidemiologická situace – akutní respirační infekce (ARI) v Libereckém kraji 1. týden 2024



Data z 1. týdne a rozdíl oproti 52. týdnu.

	0 - 5 let	6 - 14 let	15 - 24 let	25 - 64 let	65 + let	Celkem
Liberec	9% ↑ 5114	-14% ↓ 1793	23% ↑ 1622	-17% ↓ 409	6% ↑ 492	1% ↑ 1205
Jablonec n/N	19% ↑ 3251	63% ↑ 2000	14% ↑ 2162	-56% ↓ 525	-30% ↓ 348	-14% ↓ 1177
Semily	-23% ↓ 3707	103% ↑ 1791	-14% ↓ 1374	76% ↑ 688	210% ↑ 384	16% ↑ 1173
Česká Lípa	-27% ↓ 2564	28% ↑ 1074	104% ↑ 1124	445% ↑ 904	241% ↑ 573	74% ↑ 1076
ČR	35% ↑ 3147	43% ↑ 1823	42% ↑ 1798	53% ↑ 717	44% ↑ 643	44% ↑ 1228
Liberecký kraj	-3% ↓ 3938	17% ↑ 1672	21% ↑ 1577	9% ↑ 593	33% ↑ 460	9% ↑ 1167


Data za 1. KT vykazují nárůst relativní nemocnosti akutními respiračními infekcemi v rámci Libereckého kraje (LK), ale i celé České republiky. Nynější nárůst nemocnosti souvisí s nedávnými vánočními svátky.

Nižší počet případů byl zaznamenán i u onemocnění covid-19. V období 1. 1. – 4. 1. 2024 byl v LK diagnostikován virus SARS-COV-2 u 151 osobám (190 předchozím týdnem). Relativní nemocnost činila 34,13 případů na 100 000 obyvatel.

Ve vyšetřovaných laboratorních vzorcích byly zachyceny adenoviry (1), rhinoviry (1), enteroviry (1) lidský boca virus (2), respiračně syncytiální viry typu B (2) a viry chřipky A - H1N1 (3). Od začátku sezóny (podzim 2023) evidujeme 36 případů chřipky typu A, 25x se jednalo o typ A/H1N1. Chřipka typu B nebyla zatím zachycena.

V tomto týdnu byl zaznamenán 1 případ vážného průběhu chřipky s nutností umělé plicní ventilace u neočkovaného muže mladšího 60 let s úmrtím.

Stále je ještě možné nechat se u všeobecných praktických lékařů očkovat proti chřipce i proti onemocnění covid-19 (pokud neočkují praktičtí lékaři, tak v očkovacích centrech (ZÚ se sídlem v Ústí nad Labem, pracoviště Liberec, KNL – infekční oddělení, EUC Klinika Liberec).



V případě respiračního onemocnění doporučujeme udržovat dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakrývat si ústa a nos kapesníkem (případně kašlat a kýchat do rukávu), mýt si často ruce vodou a mýdlem, popř. používat dezinfekční přípravky na ruce na bázi alkoholu.

Dále doporučujeme, aby lidé nosili ochranu dýchacích cest (ideálně respirátor), a to zejména při návštěvě zdravotnických zařízení, domovů pro seniory a dalších zařízení sociálních služeb.