

PYLOVÝ KALENDÁŘ

ALERGENNÍ PYLY	BŘEZEN	DUBEN	KVĚTEN	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	poznámka
AMBRÓZIE									jednoletá, 10-150cm vysoká bylina, kvete srpen - říjen, roste na rumištích, skládkách, hojněji se vyskytuje v teplejších oblastech, do našeho kraje se dostává díky jižnímu proudění
BŘÍZA									pro uvolňování pylu jsou nutné teploty nad 15°C, slunečné počasí a mírný vítr, pyl výborně létá a může se vyskytovat ve velké koncentraci i desítky km daleko od zdroje
BOROVICE									kvete v dubnu až červnu po dosažení věku 15 až 20 let, pyl se vyskytuje v hojném počtu, ale je málo alergenní
BUK									bukové jehnědy kvete v květnu, buky najdeme především v Jizerských horách
DUB									z jara můžeme najít na dubech květy, zkříženou reaktivitou prodlužuje sezónu břízy
JITROCEL									vytrvalá bylina, roste na polích, u cest, na lukách, na ladem ležící půdě a v travnatých příkopcích, kvete od května do září
KOPŘIVA									vytrvalá bylina rozšířena jako vytrvalý plevel, indikátor vyššího obsahu dusíku v půdě, kvete od června do září, je málo alergenní
LÍSKA									kvete brzy od února do dubna ještě před vyrašením listů, startuje pylovou sezónu
PELYŇEK									vytrvalá hořce aromatická bylina, vytváří bohatá květenství od července do října, vyskytuje se roztroušeně, v teplých oblastech více
ŠŤOVÍK									vytrvalá bylina, květy vytvářejí shluky nad posledními listy, kvete od léta až do podzimu
TRÁVY									sezóna trav má několik vrcholů díky druhové rozmanitosti a kosení trávníků, po kterém opakovaně vykvétají